

GEN. **Machiloides** nov.

Coxa pedum secundi et tertii paris processu conico externe instruta; articulus ultimus tarsalis apicem versus attenuatus.

Segmenta abdominalia parte media na sternali brevissima, in segmentis 1-7 subcoxae utrimque vesicula singula instructae.

♂ Segmenta abdominalia 8^{um} et 9^{um} appendicibus genitalibus duabus subcylindricis aucta. Penis quam subcoxae brevior.

Species typica: *Machilis appendiculata* Silv.

Conspectus **Machilidarum** generum.

a. Subcoxae segmentorum abdominalium 2-5 vel 2-6 utrumque vesiculis duabus instructae.

a.¹ ♂ Segmentum abdominalis 8^{um} appendicibus genitalibus nullis, 9^{um} appendicibus genitalibus duabus quam penis valde brevioribus auctum. Penis valde elongatus, subcoxam segmenti 9ⁱ marginem posticam spatio magno superans. Gen. *Petrobius* Leach.

Typus *P. maritimus* Leach.

b.¹ ♂ Segmenta abdominalia 8^{um} et 9^{um} appendicibus genitalibus duabus instructa. Penis subcoxarum segmenti 9ⁱ marginem posticam non vel vix superans. Gen. *Machilis* L.

Typus *Lepisma polypoda* L.

b. Subcoxae segmentorum abdominalium 1-7 utrumque vesicula singula instructae.

a.² Coxae pedum parium 2ⁱ et 3ⁱ processu laterali conico auctae. ♂ Segmenta abdominalia 8^{um} et 9^{um} appendicibus genitalibus instructa.

a.³ Sternorum abdominalium pars mediana triangularis, sat longa et sat lata

. Gen. *Praemachilis* Silv.

Typus *P. excelsior* Silv.

- b.¹ Sternorum abdominalium pars mediana brevissima. Gen. *Machiloides* nov.
 Typus *Machilis appendiculata* Silv.

b.² Coxae pedum parium 2ⁱ et 3ⁱ processu laterali destitutae. ♂ Segmenta abdominalia 8^{um} et 9^{um} appendicibus genitalibus nullis. Penis brevissimus. Sternorum abdominalium pars mediana brevissima.

a.³ Tarsi articulus ultimus in apice truncatus et subtus pulvillis duobus instructus. Praetarsus unguibus in parte apicali attenuatus arenatis praeditus. Gen. *Meinertellus* Silv.
 Typus *M. pulrillatus* Silv.

b.³ Tarsi articulus ultimus apicem versus attenuatus et pulvillis destitutus. Praetarsus unguibus parum arenatis. Gen. *Machilinus* Silv.
 Typus *M. rupestris* Lucas (vel *M. Grassii* Gjard.).

Descrizione di due nuove specie italiane e tavola analitica

DI TUTTE LE SPECIE FINORA TROVATE IN ITALIA:

1. — *Machilis alternata* sp. n.

Color avellaneus vel cinerascens vel etiam interdum albicans, nigro-variegatus, margine postico mesonoti et metanoti, lateribus exceptis, nigro-castaneis, segmentis abdominalibus 3^o, 6^o et 9^o maculis duabus submedianis rectangularibus sat magnis, nigro-castaneis ornatis. Antennae parte proximali amulis nonnullis parvis albicantibus, tergito decimo et basi cerci mediani etiam albicantibus.

Oculi inter se nec spatio magno tangentes, postice margine communi-
dem angulum obtusum formantes. Oculus singulus paullulum latior

quam longior. Ocelli submedianî subcordiformes, albo marginati, sese fere tangentes, parte angustata externe vergente.

Antennae squamis et setis subtilibus instructae, corporis longitudinem subaequantes.

Thorax. Gibba thoracica sat parva.

Pedes, praesertim antici, robusti.

Abdomen. Segmenta 2-5 subcoxis utrimque vesiculis durabus arietis. Styli sat longi, squamis et setis pluribus sat longis, subtilibus instructi, nec non seta apicali longa, robusta. Styli ultimi quam subcoxæ parum minus quam duplo breviores.

Ovopositores attenuati quam subcoxæ parum breviores, setis subtilibus sat longis instructi.

Cerei squamosi, setis paucissimis brevibus subtilioribus et setis nonnullis spiniformibus lateralibus in parte proximali instructi; cerens medianus quam laterales triplo longior.

♂ Penis quam subcoxæ spatio magno brevior et quam appendices genitales paululum brevior.

Long. corp. mm. 10; lat. thoracis 2; long. antenn. 10; long. cerei mediani 13.

Habitat: Sondrio, Brescia, Bevagna, Portici.

2. — *Praemachilis meticulosa* sp. n.

Oculi inter sese magno spatio tangentes, margine eorumdem postice angulum valde obtusum formantes. Oculus singulns $\frac{1}{4}$, latior quam longior. Ocelli subcordiformes, submedianî, inter sese parum remoti, parte attenuata externe vergente, parum maiores quam in *Machilis alternatus* et parte externa minus attenuata quam in eadem specie.

Antennae squamis et setis parvis instructae, quam corpus duplo breviores.

Thorax. Gibba thoracica parva.

Pedes sat breves, robusti.

Abdomen. Styli 1-7 sat breves, squamis et setis sat longis, nec non seta robusta apicali instructi, styli ultimi quam subcoxæ $\frac{1}{4}$, breviores.

Ovopositores tennes quam styli ultimi vix longiores, setis subtilibus sat longis instructi.

Cerei squamosi, parte proximali interne setis nonnullis brevibus spiniformibus instruteti, cerens medianus quam laterales parum magis quam duplo longior.

Long. corp. mm. 11; lat. thoracis 2, 8; long. antenn. 5, 5; long. cerei mediani 11.

Habitat: Bevagna.

TAVOLA ANALITICA

PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPECIE ITALIANE DELLA FAM. MACHILIDAE

GEN. **Machilis** Latr. emend. Silv.

a. Subcoxe dei seguenti addominali 2-6 fornite ciascuna di due vesicole.

a.¹ Ocelli disposti trasversalmente innanzi agli occhi e ciascuno di essi alquanto meno largo di un occhio. Hanno una forma a pistillo cioè con una parte rotondeggiante situata nella parte submedia della fronte ed una allungata, più stretta diretta lateralmente fino quasi a livello del margine laterale degli occhi. Stili del nono segmento addominale un poco più lunghi delle subcoxe dello stesso segmento. Ovopositora un poco ingrossati verso l'apice, poco più corti degli stili del nono segmento e forniti di setole sottili e di una serie di setole robuste, nonché all'apice di 5-6 processi corti, grossetti, in forma di piccoli uncini. *Machilis cylindrica* Geoff.

b.¹ Ocelli disposti trasversalmente innanzi agli occhi e ciascuno di essi poco meno largo di un occhio. Hanno, può dirsi, la forma di una cifra otto disposta di traverso e con la parte situata nella regione subme-

diana della fronte assai più corta ed alquanto più stretta dell'altra, che si estende lateralmente fino quasi a livello del margine laterale degli occhi. Stili del nono segmento addominale alquanto più corti delle spine delle stesse spine. Ovopositor assottigliati, presso l'apice forniti di alcune setole brevi e sottili e sorpassanti di poco gli stili del nono segmento . . . *Machilis polypoda* (Linn.) (1).

- b. Subcole dei segmenti addominali 2-5 fornite ciascuna di due vesicole. Ocelli poco larghi, cordiformi, con la parte assottigliata rivolta verso l'esterno e situati immediatamente ai lati del piano sagittale mediano del capo innanzi agli occhi. *Machilis alternata* Sily.

GEN. *Praemachilis* Sily.

- a. Ocelli piccoli, poco larghi, submedianii cioè situati più o meno vicini al piano sagittale mediano del capo innanzi agli occhi.

a¹. Antenne più corte del corpo. Stili del nono segmento addominale almeno di $\frac{1}{4}$ più corti delle subcoxe dello stesso segmento.

a². Gobba toracica molto pronunciata. Ocelli alquanto arrotondati, fra di loro poco discosti e situati quasi perpendicolarmente ai lati della regione mediaна della fronte. *Praemachilis excelsior* Silv.

b². Gobba toracica poco pronunciata. Ocelli subcordiformi con la parte assottigliata rivolta verso l'esterno, tra di loro poco discosti. *Praemachilis meticulosa* Silv.

b¹. Antenne poco più lunghe del corpo. Stili del nono segmento addominale lunghi quasi quanto le subcoxe dello stesso segmento. Ocelli subrotondi *Praemachilis aurea* (Giardina).

(1) = *M. Tarqioni* Grassi = *M. sicula* Giardina.

- b. Ocelli arrotondati, poco larghi, sublaterali cioè situati innanzi alla parte anteriore laterale degli occhi anche oltre il margine laterale degli stessi. Antenne più corte del corpo
Praemachilis italicica (Grassi).

GEN. **Machilinus** Silv.

- a. Occhi molto grandi, toccantisi fra di loro quasi per tutta la lunghezza di un ocechio. Ciascun ocechio circa $\frac{1}{3}$ più lungo che largo. Ocelli piccoli, argentei, di forma quasi ellittica, situati innanzi alla parte anteriore laterale degli occhi. Ovopositori molto più lunghi degli stili del nono segmento.
Machilinus rupestris, (Lucas).
- b. Occhi abbastanza grandi, toccantisi fra di loro per un grande tratto. Ciascuno ocechio è quasi tanto lungo che largo. Ocelli piccoli, argentei, subrettangolari, situati innanzi alla parte anteriore laterale degli occhi. Ovopositori alquanto più lunghi degli stili del nono segmento.
Machilinus Kleinenbergi (Giardina).